Aláíró: Odor Tamás
2026.07.31. 11:22:02
osztályvezető

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/31/02551-37/2026	**Tárgy:**	Kifüggesztési kérelem
Ügyintéző:	Mohos Róbert	**Hiv. szám:**	-
Szerv. egység:	Növény- és Talajvédelmi Osztály	**Melléklet:**	Védekezési felhívás II.
Telefon:	06/88/590-472		

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

Kővágóörs
Petőfi u. 2.
8254

Tisztelt dr. Szabó Tímea Jegyző Asszony!

Kérem, hogy a mellékleten megküldött védekezési felhívást 2026.08.12. napjáig kifüggeszteni szíveskedjen a hivatalához tartozó települések hirdetőtábláin.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Fröhlichné Hamar Edit főispán nevében és megbízásából:

Odor Tamás
osztályvezető

Kapják:
1. Ügyfél (KRID: 520700981)
2. Irattár

A VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁSA

AZ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA IMÁGÓJA ELLEN

A BADACSONYI, BALATON-FELVIDÉKI ÉS BALATONFÜRED–CSOPAKI BORVIDÉKEK

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEINEK VESZPRÉM VÁRMEGYEI RÉSZÉRE

2026/II.

A VÉDEKEZÉS ELVÉGZÉSE MINDEN SZŐLŐTERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!

1. INDOKLÁS

A július 27-én elvégzett felmérések során a Badacsonyi borvidéken a kabóca utolsó (L_5), a Balaton-felvidéki borvidék északi felén pedig még az utolsó előtti (L_4) lárvastádiumú egyedeit lehetett azonosítani. Ez arra utal, hogy a felhívással érintett borvidékeken feltehetőleg augusztus 3. napjával kezdődő hetében az amerikai szőlőkabóca egyedi már teljesen kifejlődnek repülésre is képes imágóra.

Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el: https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg

2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A mulasztás növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

3. HATÁRIDŐK ÉS ÜTEMEZÉS

	Védekezési időszak	**Stádium**
3. kötelező védekezés	2026.08.03-2026.08.12	Imágó

4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes lista az *1. sz. mellékletben* vagy az alábbi linken:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf

5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- Amennyiben nem történt törzstisztítás akkor a törzshajtásokat is permetezze.
- Permetlé fedettsége: védekezési időszak alatt várható magas hőmérséklet miatt nagyobb cseppméret és nagyobb permetlé mennyiség válhat szükségessé.

- Bővebb információ és technológiai segédlet:

KONVENCIONÁLIS	ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján az „Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása” link alatt	Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján „Az aranyszínű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet” link alatt

6. NÖVÉNYVÉDELMI FELÜGYELŐK ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal:

Badacsonyi, Balaton-felvidéki borvidékeken

Mohos Róbert növényvédelmi felügyelő; telefon: +36-20/569-65-44

Balatonfüred-Csopaki borvidéken

Kunné Nagy-Rébék Renáta növényvédelmi felügyelő; telefon: +36-20/411-09-49

Veszprém, 2026.07.31.

Fröhlichné Hamar Edit főispán nevében és megbízásából:

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 14.

Odor Tamás
osztályvezető

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) **a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma (Grapevine flavescencedorée phytoplasma) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen** az alábbi 2026. évre vonatkozó második védekezési felhívást teszi közzé a **Badacsonyi, Balaton-felvidéki, valamint a Balatonfüred-Csopaki borvidékeken kijelölt körülhatárolt területek Veszprém vármegyei részének vonatkozásában:**

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2026. évben is folyamatosan vizsgálta a körülhatárolt területeken az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) szőlőnövényeken való elhelyezkedését, egyedfejlődését, valamint egyedszámának és betelepülésének alakulását. Az idén elvégzett növényvizsgálatok alapján elmondható, hogy az amerikai szőlőkabóca lárvái – különösen a fiatal egyedek (L_1-L_3) - döntően a szőlőnövények talaj közeli részén, jellemzően a törzshajtásokon voltak fellelhetők. Fontos megjegyezni, hogy a kifejlett alakok is előfordultak a szőlőnövények törzshajtásain. A kabóca ez évi egyedfejlődéséről elmondható, hogy a legfiatalabb egyedek (L_1) május közepétől egészen július elejéig voltak megtalálhatóak, tehát körülbelül 7 hétig elhúzódott a tojások kelése. A július 27-én elvégzett felmérések során a Badacsonyi borvidéken a kabóca utolsó (L_5), a Balaton-felvidéki borvidék északi felén pedig még az utolsó előtti (L_4) lárvastádiumú egyedeit lehetett azonosítani. Ez arra utal, hogy a felhívással érintett borvidékeken feltehetőleg augusztus 3. napjával kezdődő hetében az amerikai szőlőkabóca egyedi már teljesen kifejlődnek repülésre is képes alakra. Emellett a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a korábbi évek hasonló időszakához képest a kihelyezett sárgalapok eddig kevesebb kifejlett alakot (továbbiakban: imágó) fogtak, a hagyományos ültetvényben még a védekezési küszöb környéki, az ökológiai ültetvényben már a védekezési küszöb feletti egyedszámban. Azonban meg kell említeni, hogy a sárgalapos fogási eredmények nem minden esetben tükrözték a szőlőnövényeken növényvizsgálattal fellelhető egyedszámot. Előfordult, hogy a sárgalapon magas volt a fogási eredmény, de az adott ültetvényben nem lehetett növényvizsgálattal fellelni imágót, ugyanakkor a fordítottja is tapasztalható volt, kevés egyed a sárgalapban, magas egyedszám a növényvizsgálattal. Ugyanakkor a legtöbb imágót – sárgalapon és növényvizsgálattal is - a korábban jól művelt, de egy éve felhagyott ültetvényekben lehetett megtalálni.

A vizsgálatok eredményei alapján, ezért **a harmadik kötelező védekezést augusztus 3. napjától augusztus 12. napjáig szükséges elvégezni a körülhatárolt területek minden szőlőtermő területén.**

Az amerikai szőlőkabóca ellen a felhívás 1. számú mellékletében található táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

Lényeges, hogy a kezelés során olyan növényvédő szert használjon a szőlőtermelő, amely a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezett, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint **az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia pedig nem zárja ki a kifejlett alak elleni alkalmazását.** Ez utóbbi azért is lényeges, mert a kötelező védekezési időszakban a vizsgálatok alapján jellemzően csak imágók lesznek jelen a szőlőnövényeken.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy mivel az imágók a törzshajtásokon is előfordulnak, így ha a törzshajtások eltávolítása nem történt meg, **a kezeléseknek a szőlőnövények törzsön lévő hajtásaira is irányulnia kell**. Továbbá a kötelező védekezési időszak alatt várható magas hőmérséklet miatt nagyobb cseppméret és nagyobb permetlé mennyiség válhat szükségessé.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagukban nem elegendőek, hanem a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése indokolttá válhat. A védekezés hatékonyságának ellenőrzése, valamint a betelepülés ellenőrzése növényvizsgálattal, valamint sárga ragacslapok kihelyezésével végezhető el. A sárga ragacslapot közvetlenül a 3. kötelező kezelés megkezdése előtt célszerű kihelyezni, melyet 7-10 naponként cserélni szükséges. Az amerikai szőlőkabóca egyedszáma miatt szükségessé válhat az ismételt kezelés a betakarítás után is. Mivel a szőlőben az amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett növényvédő szerek engedélyokiratai – a Pyregard, az Aza és a NeemAzal-T/S kivételével – nem teszik lehetővé a növényvédő szerek felhasználását szüret után, a tavalyi évhez hasonlóan a NÉBIH a honlapján közleményben közzéteszi azon készítményeket, amelyek felhasználását engedélyezi.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adatlappal lehetséges.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint, a szőlő sárgaság betegség tipikus tünetei az idei évben már megjelentek. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a kialakult bogyók töppedése is folyamatban van. A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc felügyeleti szerv részére, a bejelentés a kártalanítás feltétele is.

Az eredményes védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztesse a szomszédos termelők növényvédelmi, növény-egészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

Veszprém, 2026.07.31.

Fröhlichné Hamar Edit főispán nevében és megbízásából:

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 14.

Odor Tamás
osztályvezető

Kapják:

1. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Veszprém vármegyei Szervezete (elektronikusan)
2. Badacsonyi, Balaton-felvidéki és Balatonfüred–Csopaki borvidékek hegyközségei (elektronikusan)
3. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi Igazgatósága (ni@nebih.gov.hu)
4. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (hnt@hnt.hu)
5. A körülhatárolással érintett települések polgármesteri hivatalai

1. sz. melléklet

Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méh-veszélyesség
Decis	deltametrin	III.	zsendülés (BBCH 85)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos
Decis Forte (származtatott: Detector, Nuyard)	deltametrin	I. II.	zsendülés (BBCH 85)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Decis Mega	deltametrin	II.	zsendülés (BBCH 85)	7	3	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Exirel (származtatott: Irazu)	ciántraniliprol	I. II.	zsendülés (BBCH 85)	14	2	lárva	szisztemikus	kifejezetten veszélyes
Karate Zeon 5 CS (származtatott: Full 5 CS, Kendo 5 CS, NinjaZeon 5 CS); (párhuzamos: Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS)	lambda-cihalotrin	II. III.	fürtzáródás (BBCH 78)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra)	lambda-cihalotrin	III.	fürtzáródás (BBCH 78)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes**
Klartan 24 EW (származtatott: Mavrik 24 EW, Monospel 24 EW)	tau-fluvalinát	I. II.	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21	2	lárva, imágó	kontakt	nem jelölésköteles
Sanium System (származtatott: Deltam System)	flupiradifuron	II. III.	érés kezdete (BBCH 82)	14	1	lárva, imágó	szisztemikus	nem jelölésköteles
Sivanto Prime (párhuzamos: Sivanto Prime 200 SL)	flupiradifuron	I. II.	zsendülés (BBCH 81)	14	1	lárva, imágó	szisztemikus	nem jelölésköteles***
Sivanto Energy (párhuzamos: Sivanto Energy 85 EC)	deltametrin + flupiradifuron	I.	érés kezdete (BBCH 81)	14	2	lárva, imágó	kontakt és szisztemikus	kifejezetten veszélyes
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	fürtzáródás végéig (BBCH 55-79)	14	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Sumi Alfa 5 EW (származtatott: Sumicidin 5 EW)	eszfenvalerát	I.	fürtzáródás végéig (BBCH 55-79)	14	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos**

Szőlőben kabócafajok ellen szükséghelyzeti felhasználásra engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Kijuttatási időszak
Carnadine (származtatott: Roslix, Silentium); (párhuzamos: Carnadine, Carnadine 200, Roslix)	acetamiprid	I. II.	zsendülésig (BBCH 70-85)	7	1	lárva	szisztemikus	2026.04.21.- 2026.08.18.

Csak szőlő alanytelepen felhasználható kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méhveszélyesség
Mospilan 20 SG * (származtatott: Gazelle 20 SG *, Mospilan 20 SG Original *, Rafting *, Spilan 20 SG *); (párhuzamos: Mospilan SG *)	acetamiprid	I. II. III.	érés (BBCH 15-82)	-	1	lárva	szisztemikus	nem jelölésköteles

Szőlőben ökológiai termesztésben is felhasználható kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méh-veszélyesség
Laser (származtatott: Nexsuba)	spinozad	II.	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	7	2	lárva	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Laser Duplo	spinozad	II. III.	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	7	2	lárva	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Limocide	narancsolaj	II.	fogyasztásra érettségig (BBCH 89)	1	6	lárva, imágó	kontakt	kifejezetten kockázatos
Oroganic (származtatott: Sinala, PREV-GOLD GARDEN, PREV-GOLD)	narancsolaj	II., III.	fogyasztásra érettségig (BBCH 89)	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	6	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos

Szőlőben ökológiai termesztésben is felhasználható kabócafajok ellen szükséghelyzeti felhasználásra engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Kijuttatási időszak	Méh-veszélyesség
NeemAzal-T/S	azadirachtin A	II. III.	-	3	2	lárva, imágó	nem ismert (IRAC MoA: UN)	2026.05.11.-2026.09.07.	nem jelölésköteles
Aza	azadirachtin A	II.	-	3	2	lárva, imágó	nem ismert (IRAC MoA: UN)	2026.05.11.-2026.09.07.	nem jelölésköteles
Pyregard	piretrin	I.	-	7	A készítményt vagy bármely más piretrin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen maximum kétszeri felhasználással lehet kijuttatni a teljes vegetáció alatt.	lárva, imágó	kontakt	2026.07.17.-2026.11.13.	kifejezetten kockázatos

** virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.

*** tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki

2. számú melléklet



Körülhatárolt terület